



Eyðublað fyrir skráningu þungana Lenalídómíð

▼ Þetta lyf er undir sérstöku eftirliti til að nýjar upplýsingar um öryggi lyfsins komist fljótt og örugglega til skila. Allir geta hjálpað til við þetta með því að tilkynna aukaverkanir sem koma fram til Lyfjastofnunar. Í SmPC, kafla 4.8 eru upplýsingar um hvernig tilkynna á aukaverkanir

**Eyðublað fyrir skráningu þungana
Lenalídómíð**

Vinsamlegast fyllið út þetta eyðublað til að tilkynna þungun sjúklings (á einnig við um konur sem eru makar karlsjúklinga) sem er í meðferð með lenalídómíði. Sendið það strax til Alvogen, upplýsingar má sjá hér fyrir neðan.

phv@alvogen.is

Sími: 522 2900

Einnig skal tilkynna um þunganir beint til Lyfjastofnunar, www.lyfjastofnun.is.

Notuð eru sömu eyðublöð og þegar aukaverkanir eru tilkynntar.



Þetta lyf er undir sérstöku eftirliti til að nýjar upplýsingar um öryggi lyfsins komist fljótt og örugglega til skila. Allir geta hjálpað til við þetta með því að tilkynna aukaverkanir sem koma fram til Lyfjastofnunar. Í SmPC, kafla 4.8 eru upplýsingar um hvernig tilkynna á aukaverkanir

Eyðublað vegna þungunar				
Upplýsingar frá viðkomandi lækni				
Nafn læknis:		Staða:		
Heimilsfang:		Bær, land:		
Netfang:		Símanúmer:		
Faxnúmer:				
Upplýsingar um kvenkynssjúkling				
Nafn sjúklings:				
Kennitala:				
Kvenkyns maki karlkyns sjúklings				
Nafn:				
Kennitala:				
Upplýsingar um meðferð: lenalídómíð hylki				
Lotunúmer:	Fyrnist:	Skammtar:	Fjöldi:	
Upphafsdagur:		Lokadagur:		
Ábending:				
Eftirfylgni við þungun				
			Já	Nei
Hefur sjúklingnum þegar verið vísað til kvensjúkdóma-/fæðingarlæknis?				
Ef já, vinsamlega gefið upp nafn læknis og upplýsingar um hvernig næst í hann:				
Ástæður þess að „Reglum um getnaðarvarnir“ var ekki fylgt				
			Já	Nei
Rangt mat á barneignarhæfni				
Ef já, gefið ástæður fyrir röngu mati:				
a. Aldur ≥ 50 ár og eðlilegar blæðingar ekki komið fram í ≥ 1 ár				
b. Ótímabær tíðahvörf, staðfest af kvensjúkdómasérfræðingi				
c. Fyrri tvíhliða eggjaleiðara- og eggjastokksnám, eða legnám				
d. XY arfgerð, Turner heilkenni, leg ekki til staðar				

▼ Þetta lyf er undir sérstöku eftirliti til að nýjar upplýsingar um öryggi lyfsins komist fljótt og örugglega til skila. Allir geta hjálpað til við þetta með því að tilkynna aukaverkanir sem koma fram til Lyfjastofnunar. Í SmPC, kafla 4.8 eru upplýsingar um hvernig tilkynna á aukaverkanir

Greinið frá því hvaða aðferð af neðangreindum lista var notuð við getnaðarvarnir	Já	Nei
a. Vefjalyf		
b. Lykkja sem inniheldur levónorgestrel		
c. Medroxýprógesterónacetat forðalyf		
d. Ófrjósemisaðgerð á eggjaleiðurum		
I. Eggjaleiðarar saumaðir saman		
II. Eggjaleiðarar brenndir		
III. Klemmur á eggjaleiðara		
e. Eingöngu kynmök við karlkyns maka sem hefur gengist undir sáðrásarúrnám; staðfesta þarf sáðrásarúrnám með tveimur neikvæðum greiningum á sæði		
f. Getnaðarvarnarpillur sem hindra egglos og innihalda eingöngu prógesterón (þ.e. desógestrel)		
g. Önnur lyf í töfluformi, sem aðeins innihalda prógesterón		
h. Samsett getnaðarvarnarlyf til inntöku		
i. Aðrar lækningavörur til notkunar í legi		
j. Smokkur		
k. Hetta		
l. Lykkja		
m. Rofnar samfarir		
n. Annað		
o. Engin getnaðarvörn		
Greinið af neðangreindum lista orsök þess að getnaðarvörnin brást	Já	Nei
Of lítið tekið af getnaðarvarnarlyfi til inntöku		
Annað lyf eða ómeðhöndlaður sjúkdómur hefur áhrif á getnaðarvarnarlyf til inntöku		
Tilgreint óhapp við notkun verju		
Óþekkt orsök		
Hafði sjúklingurinn samþykkt algert skírlífi?		
Var meðferð með lenalídómíði hafin þrátt fyrir þungun sjúklings?		
Fékk sjúklingurinn upplýsingaefni um hugsanlega hættu á vansköpun?		
Fékk sjúklingur upplýsingar um að forðast þungun?		

▼ Þetta lyf er undir sérstöku eftirliti til að nýjar upplýsingar um öryggi lyfsins komist fljótt og örugglega til skila. Allir geta hjálpað til við þetta með því að tilkynna aukaverkanir sem koma fram til Lyfjastofnunar. Í SmPC, kafla 4.8 eru upplýsingar um hvernig tilkynna á aukaverkanir

Upplýsingar um meðgöngu						
Dagur síðustu blæðinga:				Áætluð fæðing:		
Þungunarpróf	Viðmiðunarsvæði			Dagsetning		
Þvag						
Sermi						
Fæðingarsaga						
Þungunarár	Niðurstaða					
	Fósturlát	Fóstureyðing	Lifandi fædd	Andvana fædd	Lengd meðgögu	Fæðingar- aðferð
Fæðingargallar						
					Já	Nei
Komu fæðingargallar fram í einhverri af þungununum?						
Er um arfgenga fæðingargalla að ræða í fjölskyldusögu?						
Ef svarið er já við einhverri ofangreindra spurninga, vinsamlega skýrið hér fyrir neðan.						
Sjúkrasaga móður						
Sjúkdómur	Dagsetning		Meðferð	Niðurstaða		
	Til	Frá				

▼ Þetta lyf er undir sérstöku eftirliti til að nýjar upplýsingar um öryggi lyfsins komist fljótt og örugglega til skila. Allir geta hjálpað til við þetta með því að tilkynna aukaverkanir sem koma fram til Lyfjastofnunar. Í SmPC, kafla 4.8 eru upplýsingar um hvernig tilkynna á aukaverkanir

Núverandi heilsufarsástand móður			
Sjúkdómur	Frá	Meðferð	
Félagsleg saga móður			
		Já	Nei
Áfengi			
Ef já, magn/fjöldi drykkja á dag:			
Tóbak			
Ef svarið er já, magn á dag:			
Fíkniefni (afþreyingarnotkun lyfja)			
Ef já, lýsið hér fyrir neðan:			
Lyfjanotkun móður á meðgöngu og 4 vikum fyrir þungun (þar með taldar jurtir, óhefðbundin og ekki lyfseðilsskyld lyf og bætiefni)			
Lyf/meðferð	Upphafsdagur	Lokadagur/ enn í meðferð	Ábending
Eyðublað er fyllt út af	Undirskrift	Dagsetning	

▼ Þetta lyf er undir sérstöku eftirliti til að nýjar upplýsingar um öryggi lyfsins komist fljótt og örugglega til skila. Allir geta hjálpað til við þetta með því að tilkynna aukaverkanir sem koma fram til Lyfjastofnunar. Í SmPC, kafla 4.8 eru upplýsingar um hvernig tilkynna á aukaverkanir