

## Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

**Volidax 30 mg hörð hylki**  
**Volidax 50 mg hörð hylki**  
**Volidax 70 mg hörð hylki**

lisdexamfetamíntvímesýlat

### Mikilvæg atriði sem þú þarft að vita um lyfið

**Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar.**

- Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.
- Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.
- Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.
- Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4, til að fá frekari upplýsingar.

### Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

1. Upplýsingar um Volidax og við hverju það er notað
2. Áður en byrjað er að nota Volidax
3. Hvernig nota á Volidax
4. Hugsanlegar aukaverkanir
5. Hvernig geyma á Volidax
6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

### 1. Upplýsingar um Volidax og við hverju það er notað

#### Hvað Volidax er

Volidax inniheldur virka efnið lisdexamfetamíntvímesýlat sem hjálpar til við heilastarfsemina. Lyfið getur hjálpað til við að bæta athygli þína og einbeitingu og jafnframt dregið úr hvatvísi. Volidax er langverkandi lyf sem virkar smám saman á 14 klukkustunda tímabili.

#### Við hverju það er notað

Volidax er meðferð við „athyglisbresti með ofvirkni“ (ADHD) hjá fullorðnum.

Leitið til læknis ef sjúkdómseinkenni versna eða lagast ekki eftir eins mánaðar meðferð.

Fyrir börn og unglunga á aldrinum 6 til 17 ára er fánlegt annað lyf sem inniheldur lisdexamfetamíntvímesýlat. Volidax er ekki notað til að meðhöndla ADHD hjá börnum yngri en 6 ára því ekki er vitað hvort það sé öruggt eða hjálpi svona ungu fólki.

#### Hvernig það virkar

Volidax eykur virkni í ákveðnum hlutum heilans sem eru ekki nægilega virkir.

Lyfið getur hjálpað til við að bæta athygli og einbeitingu og jafnframt dregið úr hvatvísi.

Lyfið er gefið sem hluti af meðferðaráætlun sem venjulega samanstendur af eftirfarandi:

- sálfræðimeðferð
- fræðslumeðferð
- atferlismeðferð

- iðjuþjálfun
- félagslegri meðferð

Því er eingöngu ávísað af læknum sem hafa reynslu í að meðhöndla einstaklinga með hegðunarvandamál.

Ef þú hefur ekki fengið meðferð við ADHD áður mun læknirinn athuga hvort þú hafir verið með ADHD frá barnæsku áður en hann ávísar Volidax.

## Um ADHD

Fólki með ADHD finnst erfitt að:

- sitja kyrrt
- einbeita sér

Það er ekki þeim að kenna að þau geta ekki gert þetta. Hins vegar getur ADHD valdið erfiðleikum í daglegu lífi. Fólk með ADHD getur átt í erfiðleikum með að vinna, læra, með sambönd og haft lágt sjálfsálit.

ADHD hefur ekki áhrif á greind einstaklings.

## 2. Áður en byrjað er að nota Volidax

Verið getur að læknirinn hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en tiltekið er í þessum fylgiseðli. Ávallt skal fylgja fyrirmælum læknis og leiðbeiningum á merkimiða frá lyfjabúð.

### EKKI má nota Volidax

- ef um er að ræða ofnæmi fyrir lisdexamfetamíni eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6)
- ef þú tekur lyf sem kallast „mónóamín-oxídasahemill“ (MAO-hemill) sem notað er við þunglyndi, eða ef þú hefur tekið MAO-hemil á síðustu 14 dögum
- ef þú ert með skjaldkirtilsvandamál
- ef þú finnur fyrir óvenjulegum spenningi, ofvirkni eða hömluleysi
- ef þú hefur einhvern tíma verið með hjartavandamál - eins og hjartaáfall, óreglulegan hjartslátt, verki og óþægindi í brjósti, hjartabilun, hjartasjúkdóm eða meðfæddan hjartasjúkdóm
- ef þú ert með háan eða mjög háan blóðþrýsting eða þrengsli í æðum
- ef þú ert með aukinn þrýsting í auga (gláku)

Ekki má nota Volidax ef eitthvað af ofantöldu á við um þig. Ef þú ert ekki viss skaltu leita ráða hjá læknum eða lyfjafræðingi áður en Volidax er notað. Það er vegna þess að Volidax getur aukið á þessi einkenni.

### Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá læknum eða lyfjafræðingi áður en Volidax er notað:

- ef þú hefur misnotað lyfseðilsskyld lyf eða fíkniefni
- ef þú hefur verið með nýrnavandamál
- ef þú hefur fengið flog (krampa, rykkjakrampa eða flogaveiki) eða óeðlilegt heilalínurit (EEG)
- ef þú fyrirhugar þungun eða ert þunguð (sjá kaflann „Meðganga, brjóstagið og frjósemi“)
- ef þú færð endurtekna kippi sem erfitt er að hafa stjórn á í einhvern hluta líkamans eða ef þú endurtekur hljóð og orð
- ef þú ert með háan blóðþrýsting
- ef þú ert með fjölskyldu- eða sjúkrasögu um óreglulegan hjartslátt (sem sést á hjartalínuriti), eða ert með sjúkdóm og/eða færð meðferð sem eykur tilhneigingu til óreglulegs hjartsláttar eða ójafnvægi blóðsalta

- ef þú ert með hjartavandamál sem ekki kemur fram í kaflanum „Ekki má nota“ hér að ofan
- ef þú ert með geðræn vandamál. Þau geta m.a. verið:
  - skapsveiflur (frá geðhæð yfir í geðlægð - kallast „geðhvarfasýki“)
  - nýtilkomin árásarhvöt eða óvingjarnleiki (fjandsamleiki) eða árásarhvöt þín versnar
  - að sjá, heyra eða upplifa hluti sem eru ekki til staðar (ofskynjanir)
  - að trúa hlutum sem eru ekki sannir (ranghugmyndir)
  - að finna fyrir óvenjulegri tortryggni (vænisyki)
  - að finna fyrir æsingi, kvíða eða taugaspennu
  - að finna fyrir þunglyndi eða sektarkennd

Látið lækinn eða lyfjafræðing vita ef eitthvað af ofangreindu á við um þig áður en meðferð hefst. Það er vegna þess að Volidax getur aukið á þessi einkenni. Læknirinn vill fylgjast með því hvernig lyfið verkar á þig.

Volidax getur valdið hjartsláttaróreglu hjá sumum sjúklingum. Ef þú finnur fyrir hjartsláttarónotum eða óreglulegum hjartslætti á meðferðartímabilinu skaltu láta lækinn vita án tafar. Hættan á hjartakvillum getur aukist með hækkandi skammti. Því á að fylgja ráðlagðri skömmtun.

### **Prófanir sem læknirinn gerir áður en þú byrjar að taka Volidax**

Þessar prófanir eru til að ákveða hvort Volidax sé rétta lyfið fyrir þig. Læknirinn spyr þig um:

- önnur lyf sem þú tekur
- hvort um sé að ræða fjölskyldusögu um skyndilegt óútskýrt dauðsfall
- aðra sjúkdóma (eins og hjartavandamál) sem þú eða fjölskylda þín kunnið að hafa
- líðan þína, eins og hvort þú finnur fyrir hamingju eða depurð, hvort þú sért með undarlegar hugsanir eða hvort þú hafir áður fundið fyrir þessum tilfinningum
- hvort um sé að ræða fjölskyldusögu um „vöðvakvik“ (endurtekna kippi sem erfitt er að hafa stjórn á í einhverjum hluta líkamans eða ef þú endurtekur hljóð og orð)
- geðræn vandamál eða hegðunarvandamál sem þú eða aðrir fjölskyldumeðlimir hafa verið með. Læknirinn skoðar geðheilsusögu þína og athugar hvort einhver í fjölskyldunni sé með sögu um sjálfsvíg, geðhvarfasýki (skapsveiflur frá geðhæð yfir í geðlægð) eða þunglyndi.

Mikilvægt er að þú veitir eins miklar upplýsingar og þú getur. Það hjálpar læknum að ákveða hvort Volidax sé rétta lyfið fyrir þig. Læknirinn gæti ákveðið að aðrar læknisfræðilegar prófanir séu nauðsynlegar áður en byrjað er að taka lyfið.

### **Notkun annarra lyfja samhliða Volidax**

Látið lækinn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð.

**EKKI** taka Volidax ef þú:

- tekur lyf sem heitir „mónóamín-oxídasahemill“ (MAO-hemill) sem notað er við þunglyndi, eða ef þú hefur tekið MAO-hemil á síðustu 14 dögum. Ef þú tekur MAO-hemil með Volidax getur það valdið skyndilegri hækkun á blóðþrýstingnum. Læknirinn eða lyfjafræðingur getur sagt þér hvort þú takir lyf sem er MAO-hemill.

Volidax og sum önnur lyf geta haft áhrif á hvert annað. Ef þú tekur eitthvert eftirtalinna lyfja skaltu ráðfæra þig við lækinn eða lyfjafræðing áður en þú tekur Volidax:

- lyf við alvarlegum geðrænum vandamálum
- lyf sem notuð eru til að lækka eða hækka blóðþrýsting
- lyf sem notuð eru við skurðaðgerðir, eins og verkjalyf
- lyf við hósta og kvefi. Sum þeirra innihalda lyf sem geta haft áhrif á blóðþrýstinginn, því er mikilvægt að leita ráða hjá lyfjafræðingnum þegar þú kaupir eitthvað af þessum vörum
- lyf sem geta haft áhrif á sýrustig þvagsins, eins og C-vítamín (askorbínsýra) eða natríumbíkarbónat (til dæmis í lyfjum við meltingartruflunum).

Ef þú ert ekki viss um hvort lyf sem þú tekur er á listanum hér að ofan skaltu leita ráða hjá læknum eða lyfjafræðingi áður en þú tekur Volidax.

## Lyfjapróf

Lyfið getur gefið jákvæða niðurstöðu á lyfjaprófi.

## Meðganga og brjóstgjöf

Við meðgöngu, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá læknum áður en lyfið er notað. Líkaminn brýtur Volidax niður í önnur efni sem geta farið yfir fylgjuna og í brjóstamjólkina. Fyrirliggjandi upplýsingar um notkun lisdexamfetamíntvímesýlats á fyrstu þremur mánuðum meðgöngu benda ekki til aukinnar hættu á meðfæddri vansköpun hjá barninu, en hættan á meðgöngueitrun (ástand sem kemur yfirleitt upp eftir 20 vikna meðgöngu og einkennist af háum blóðþrýstingi og prótíni í þvagi) og fyrirburafæðingu kann að vera meiri. Nýburar sem voru útsettir fyrir amfetamíni á meðgöngu geta fengið fráhrarfeinkenni (skjálfta, þirring, herta vöðvaspennu). Þú skalt ekki nota lyfið á meðgöngu nema lækningarnir hafi sérstaklega ráðlagt þér það eða hafa barn á brjósti meðan þú tekur Volidax.

## Akstur og notkun véla

Þú gætir fundið fyrir sundli, átt erfitt með sjónskerpu eða verið með óskýra sjón þegar þú tekur Volidax. Ef þetta gerist er hættulegt að gera hluti eins og að aka eða nota vélar. Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni. Eitt af því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana. Lýsing á verkun og aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn. Ef þörf er á skal ræða þetta við lækni eða lyfjafræðing.

## Volidax inniheldur natríum

Lyfið inniheldur minna en 1 mmól (23 mg) af natríum í hverju hylki, þ.e.a.s. er sem næst natríumlaust.

## 3. Hvernig nota á Volidax

### Hversu mikið á að taka

Alltaf skal nota lyfið nákvæmlega eins og lýst er í þessum fylgiseðli eða eins og lækningarnir hefur mælt fyrir um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá læknum eða lyfjafræðingi.

Volidax er eingöngu ætlað þér. Ekki má gefa það öðrum, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Hámarksskammturinn er 70 mg á dag.

### Hvernig nota á Volidax

- Taktu Volidax á morgnana fyrir morgunverð. Það má taka með eða án matar.
- Tvær leiðir eru til að taka Volidax:
  - Gleyptu hylkið í heilu lagi með sopa af vatni
  - Opnaðu hylkið og tæmdu innihaldið í:

- Mjúka fæðu eins og jógúrt

- Glas af vatni eða appelsínusafa

Notaðu skeið til að mylja köggla og hrærðu Volidax saman við jógúrt, vatn eða appelsínusafa þar til það hefur blandast saman að fullu. Borðu allt jógúrtið eða drekktu allt vatnið eða appelsínusafann strax eftir blöndun með Volidax. Ekki má geyma það.

Ekki hafa áhyggjur þótt filma sé í glasinu eða ílátinu á eftir - þetta er ekki virka innihaldsefnið.

## Skammtur

- Læknirinn segir þér hvaða styrkleika hylkis þú átt að taka (Volidax 30 mg, 50 mg eða 70 mg hylki) á hverjum degi.
- Ráðlagður skammtur í upphafi meðferðar er 30 mg. Síðar gæti læknirinn aukið hann í 50 mg eða 70 mg.
- Ef þú ert með nýrnatengd vandamál gæti læknirinn minnkað skammtinn.
- Ekki skipta skammtinum sem er í hylkinu, taktu allt innihald hylkisins. Ekki taka minna en eitt hylki á dag.

## Ef þér líður ekki betur eftir 1 mánaðar meðferð

Ef þér líður ekki betur skaltu láta lækninn vita. Þú gætir þurft aðra meðferð.

## Ef Volidax er ekki notað á réttan hátt

- Ef Volidax er ekki notað á réttan hátt getur það valdið óeðlilegri hegðun. Þér gæti líka byrjað að líða eins og þú þurfir lyfið í öðrum tilgangi en að hjálpa til við ADHD. Láttu lækninn vita ef þú hefur einhvern tíma átt við vandamál að stríða hvað varðar áfengi, lyfseðilsskyld lyf eða fíkniefni.

Ef tekinn er stærri skammtur af Volidax en mælt er fyrir um

Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222).

Einkenni ofskömmunar geta verið: Eirðarleysi, skjálfti, auknar ósjálfráðar hreyfingar, vöðvakippir, hröð öndun, rugl, tilhneiging til að berjast eða deila, að sjá, finna fyrir eða heyra hluti sem eru ekki raunverulegir (ofskynjanir), skelfingarastand, hár hiti eða niðurbrot vöðva. Þreyta og þunglyndi geta fylgt í kjölfarið. Ógleði eða uppköst, niðurgangur og magakrampar geta einnig komið fram. Hugsanlegt er að fram komi breytingar á hjartslætti (hægur, hraður eða óreglulegur), hár eða lágur blóðþrýstingur, blóðrásarbilun, kippir og dá.

## Ef gleymist að taka Volidax

Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka. Ef þú gleymir skammti skaltu bíða til næsta dags. Forðastu að taka það síðdegis vegna möguleika á svefntruflunum (svefnleysi).

Ef hætt er að nota Volidax

Ef þú hættir að taka lyfið geta ADHD-einkenni komið aftur.

Ekki hætta að taka lyfið án samráðs við lækninn. Þú skalt ekki hætta skyndilega að taka lyfið á eigin spýtur.

## Það sem læknirinn gerir þegar þú tekur Volidax

### Læknirinn gerir nokkrar prófanir

- áður en þú byrjar - til að tryggja að Volidax sé öruggt fyrir þig og muni koma að gagni.
- eftir að þú byrjar - læknirinn mun gera prófanir a.m.k. á 6 mánaða fresti, en hugsanlega oftar. Einnig þarf að gera þessar prófanir ef skammtinum er breytt. Þessar prófanir fela í sér:
  - eftirlit með matarlyst
  - þyngdarmælingu
  - mælingu á blóðþrýstingi og hjartsláttartíðni
  - athugun á því hvort þú eigir við vandamál að stríða hvað varðar skap, hugarástand eða einhverjar aðrar óvenjulegar tilfinningar eða hvort slíkt hefur versnað á meðan þú tekur Volidax.

## Langtímameðferð

Ekki þarf að taka Volidax til frambúðar. Ef þú tekur Volidax í meira en eitt ár á lækningunni að stöðva meðferðina í stuttan tíma. Það leiðir í ljós hvort þú þurfir enn lyfið.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

## 4. Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum. Læknirinn mun ræða við þig um þessar aukaverkanir.

**Sumar aukaverkanir geta verið alvarlegar. Ef þú færð einhverja af eftirtöldum aukaverkunum skaltu tafarlaust leita læknis:**

### Algengar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 fullorðnum)

- óreglulegur hjartsláttur (hjartsláttarónot)
- brjóstverkir (geta verið merki um hjartasjúkdóm)

### Sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 fullorðnum)

- óvenjulegur spenningur, ofvirkni eða hömluleysi (oflæti)
- ofnæmisviðbrögð (ofnæmi)

### Tíðni ekki þekkt: ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum

- að sjá, upplifa eða heyra hluti sem eru ekki raunverulegir (ofskynjanir)
- alvarleg ofnæmisviðbrögð sem einkennast af miklu blóðþrýstingsfalli, öndunarerfiðleikum og ofsakláða/kláða (bráðaofnæmisviðbrögð)
- að sjá, upplifa eða heyra hluti sem eru ekki raunverulegir, vænisýki, ranghugmyndir (geðrofslotur)
- flog (krampur)
- hjartað slær í óeðlilegum takti, lífshættulegur óreglulegur hjartsláttur (sést á hjartalínuriti). Sjá kafla 2, Varnaðarorð og varúðarreglur
- ofnæmisliffraskaði sem getur komið fram sem gulnun augna og/eða húðar (eósínófil lifrabólga)
- bólga í andliti, tungu eða hálsi; kyngingarerfiðleikar; ofsakláði og öndunarerfiðleikar (ofsabjúgur) eða alvarleg húðútbrot í húð og slímhúð, með blöðrum eða án, eða húðerting, sár eða bólgur í munn, hálsi, augum, nefi og umhverfis kynfæri (Stevens-Johnson heilkenni)
- mæði eða þroti á fótleggjum (einkenni um sjúkdóm í hjartavöðva)

Ef þú færð einhverja af ofangreindum aukaverkunum skaltu tafarlaust leita læknis.

**Aðrar aukaverkanir eru eftirfarandi. Ef þær verða alvarlegar skaltu láta lækninn eða lyfjafræðing vita:**

### Mjög algengar (geta komið fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 fullorðnum)

- minnkuð matarlyst
- erfiðleikar við að sofa
- munnþurrkur
- höfuðverkur

### Algengar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 fullorðnum)

- æsingur, taugaspenna, kvíði eða pirringur
- óvenjuleg þreyta eða eirðarleysi
- vangeta til að ná eða viðhalda stinningu eða breytingar á kynhvöt
- svimi
- stjórnlausir rykkir, hristingur, skjálfti eða óvenjuleg virkni
- endurteknir kippir sem erfitt er að hafa stjórn á í einhverjum hluta líkamans eða endurtekning á hljóðum og orðum (vöðvakvik)

- skapsveiflur
- hár blóðþrýstingur, hraður eða óreglulegur hjartsláttur (hraðtaktur)
- öndunarerfiðleikar
- ógleði eða niðurgangur
- hægðatregða
- þyngdartap
- mikil svitamyndun
- magaverkir
- tannagnístur

### **Sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 fullorðnum)**

- óhóflegt tal
- þunglyndi, kvíði, depurð eða óróleiki (vanlíðan)
- óhófleg hamingjutilfinning eða spenningur (sæluvíma)
- óhóflegt kropp í húð
- stjórnlausir vöðvakippir eða rykkir í líkamanum
- óvenju mikil syfja
- kláði, útbrot eða upphleypt rauð útbrot með kláða (ofsakláði)
- óskýr sjón
- hár hiti (sótthiti)
- uppköst
- málmbragð eða breytingar á bragðskyni (bragðskynstruflun)
- yfirlið
- blóðnasir

### **Tíðni ekki þekkt: ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum**

- mikil víkkun sjáaldra
- árásarhvöt
- lélegt blóðflæði sem veldur því að tær og fingur verða dofdir og föllir (Raynauds heilkenni)

### **Áhrif á þyngd**

Volidax getur valdið þyngdartapi hjá sumu fólki.

Læknirinn mun fylgjast með þyngdinni og hversu vel þú borðar. Ef þú ert að léttast gæti læknirinn stöðvað meðferð með Volidax í stuttan tíma.

### **Tilkynning aukaverkana**

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir **beint til Lyfjastofnunar, [www.lyfjastofnun.is](http://www.lyfjastofnun.is)**. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

## **5. Hvernig geyma á Volidax**

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á glasinu og öskjunni á eftir EXP. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Geymið við lægri hita en 30°C.

Ekki skal nota lyfið ef hylkin líta út fyrir að vera skemmd.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið.

## 6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

### Volidax inniheldur

Virka innihaldsefnið er lisdexamfetamíntvímesýlat.

Hvert 30 mg hylki inniheldur 30 mg lisdexamfetamíntvímesýlat, sem jafngildir 8,9 mg af dexamfetamíni.

Hvert 50 mg hylki inniheldur 50 mg lisdexamfetamíntvímesýlat, sem jafngildir 14,8 mg af dexamfetamíni.

Hvert 70 mg hylki inniheldur 70 mg lisdexamfetamíntvímesýlat, sem jafngildir 20,8 mg af dexamfetamíni.

Önnur innihaldsefni eru:

- Innihald hylkis: örkristallaður sellulósi, kroskarmellósanatríum, magnesíumsterat
- Hylkisskel: matarlím, títantvíoxíð (E171), svart blek (shellac, própýlenglýkól, svart járnnoxíð og kalíumhýdroxíð)
- Litarefni í hylkisskel:
  - 30 mg: gult járnnoxíð (E172), rautt járnnoxíð (E172)
  - 50 mg: indígótín karmín (E132)
  - 70 mg: gult járnnoxíð (E172), rautt járnnoxíð (E172), indígótín karmín (E132)

### Lýsing á útliti Volidax og pakkningastærðir

Plastglas með barnaöryggisloki

30 mg: Hvítur botn og appelsínugult lok, með áprentuðu „TEV“ og „30 mg“ með svörtu bleki.

50 mg: Hvítur botn og blátt lok, með áprentuðu „TEV“ og „50 mg“ með svörtu bleki.

70 mg: Blár botn og appelsínugult lok, með áprentuðu „TEV“ og „70 mg“ með svörtu bleki.

Hvert hylki er um það bil 19 mm að lengd og 6 mm að breidd.

Pakkningastærðir: 10 eða 30 hylki.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

### Markaðsleyfishafi og framleiðandi

#### Markaðsleyfishafi

Teva B.V.  
Swensweg 5  
2031 GA Haarlem  
Holland

#### Framleiðandi

Pliva Croatia Ltd.



Prilaz baruna Filipovica 25  
10000 Zagreb  
Kroatía HR

**Umboð á Íslandi**

Teva Pharma Iceland ehf.  
Dalshraun 1  
220 Hafnarfjörður

**Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í nóvember 2023.**